

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE  
PESSOAL TÉCNICO - ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG/2017**

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas preliminares da prova de **MÉDICO/ÁREA: PSIQUIATRIA** do CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG/2017. Essas respostas serão utilizadas como referência no processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se encaixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas das bancas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento. Respostas parciais também serão aceitas, e na pontuação a elas atribuída serão considerados diferentes níveis de acerto.

**Questão 01**

Transtorno bipolar do humor tipo 1. Justificativa: a paciente manifestou previamente sintomas psicóticos e necessitou de internação. Mesmo não preenchendo o tempo mínimo para a mania, os sintomas foram graves o suficiente para justificar internação.

Condutas: internação, pelo risco de suicídio; acréscimo de outra medicação (acrescentar e não retirar o lítio seria ideal, já que possui ação contra suicídio), a medicação a ser acrescentada poderia ser a bupropiona, já que, além da ação antidepressiva, em combinação com o lítio para o episódio depressivo atual, poderia inclusive auxiliar reduzindo a falta de energia, a sonolência excessiva e o apetite aumentado da paciente. Outras possíveis medicações a serem acrescentadas seriam inibidores da recaptação da serotonina, lamotrigina ou quetiapina. O lítio também pode ser trocado por quetiapina ou lamotrigina.

(20 pontos)

**Questão 02**

Alucinação é a percepção clara e definida de um objeto (voz, ruído, imagem) sem a presença do objeto estimulante real. Alucinação hipnopompica é a percepção clara e definida de um objeto que ocorre na fase de transição sono vigília, em que o indivíduo está despertando do sono. Alucinose é o fenômeno pelo qual o paciente percebe a alucinação como estranha à sua pessoa, sendo que o indivíduo tem crítica do que está acontecendo e reconhece como patológico. Ilusão é a percepção deformada de um objeto real e presente.

(20 pontos)

**Questão 03**

A ocupação excessiva de receptores dopaminérgicos D2 na via nigroestriatal pode causar alterações motoras, o “parkinsonismo” (sintomas extrapiramidais), distonias aguda e tardia e discinesia tardia. Pelo bloqueio dopaminérgico excessivo na via tuberoinfundibular, o paciente pode apresentar aumento nos níveis de prolactina, ocasionando galactorreia e amenorreia. O bloqueio na via mesocortical pode diminuir ainda mais a atividade desta via (já reduzida na esquizofrenia), causando piora dos sintomas negativos, cognitivos e afetivos da doença. O bloqueio na via mesolímberica seria o responsável por reduzir a hiperatividade dessa via, resultando no tratamento dos delírios e das alucinações.

(20 pontos)

Goiânia, 10 de abril de 2017.